



**CUENTA DE ALTO COSTO**




Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo

**Recomendaciones**  
para las personas con  
**artritis**  
**reumatoide**

Durante la contingencia por  
COVID/19

# Recomendaciones para las personas con artritis reumatoide durante la contingencia por COVID/19

- No suspenda ni reduzca el tratamiento farmacológico en este momento, a menos que el médico lo indique por un motivo específico e individualizado.
- En las personas con artritis reumatoide positivas para COVID-19, se debe interrumpir la terapia biológica, como se haría con cualquier infección activa; el tratamiento puede reanudarse después de que la infección haya desaparecido. Pero siempre, concertado con el médico o reumatólogo.
- Verifique su estado de vacunación, especialmente para enfermedades como: influenza, neumococo y tosferina



## Recomendaciones generales para los pacientes

- Lávese las manos con regularidad, durante al menos 20 segundos con agua y jabón. Después, séquese bien las manos.
- Evite tocarse la cara.
- La tos o los estornudos deben realizarse en el codo o papel y este último debe desecharse de manera segura e inmediata.
- Use pañuelos desechables.
- Use un tapabocas cuando tenga síntomas respiratorios; si no hay síntomas, no es necesario usarlo.
- Es imperante que practique el distanciamiento social sensible, especialmente de las personas que parecen estar enfermas, por ejemplo, tos o estornudos.
- Trate de evitar el transporte público y los grupos de personas.

Fuente: EULAR (European League Against Rheumatism) [https://www.eular.org/eular\\_guidance\\_for\\_patients\\_covid19\\_outbreak.cfm](https://www.eular.org/eular_guidance_for_patients_covid19_outbreak.cfm)

# #QuédateEnCasa