



CUENTA DE ALTO COSTO

Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo

Recomendaciones

para las unidades

renales

Durante la contingencia por
COVID/19

Recomendaciones de la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial

en caso de presentarse un paciente con sospecha de infección por coronavirus en cualquier unidad renal del país

MEDIDAS EN SALA DE DIÁLISIS

- Los utensilios y materiales deben ser dedicados a un único paciente y deben ser limpiados y desinfectados
- No se deben usar carros comunes para llevar medicación a los pacientes
- No dar alimentos a los pacientes durante la sesión de hemodiálisis
- Dar cumplimiento al lavado de manos

EN CASO DE AQUELLOS PACIENTES CON EPISODIO DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA)

- Contar con áreas hospitalarias exclusivas para asistencia de pacientes infectados.
- No habiendo evidencia de superioridad de una modalidad de diálisis sobre otra, los pacientes deben recibir tratamiento sustitutivo renal de acuerdo a las mejores prácticas y evidencia disponible para el tratamiento de la IRA.

POTENCIALES DONANTES

- Se recomienda posponer la donación de órganos, sangre, células y tejidos de donantes tras la posible exposición a un caso confirmado o tras regresar de países con transmisión local sostenida
- Aquellos casos confirmados deben descartarse como donantes durante un periodo tras la resolución de los síntomas y de completar la terapia. Se recomiendan 21 días como plazo de seguridad

